

COVID-19 PROTOCOL AUDIOVISUELE SECTOR – VERSIE 3.0 / 1 JULI 2020

TEN GELEIDE

Waarin verschilt versie 3.0 van het protocol (1 juli 2020) van versie 2.0 (29 mei 2020)?

- 1. AFSTAND** | Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden (punt 5).
- 2. TEST BIJ KLACHTEN** | Bij gezondheidsklachten wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een COVID-19-besmetting - bijvoorbeeld via de GGD of huisarts, (punt 7 en 8). Zie ook onderstaande, meer uitgebreide toelichting.
- 3. SCHOONMAAK** | Voor het schoonmaken van locaties en gebruiksvoorwerpen is het gebruik van desinfectiemiddelen niet langer vereist. Ga uit van de algemene hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (punt 10, 14, 21 en 37).
- 4. VIEWINGS** | Viewings hoeven niet langer zo veel als mogelijk online georganiseerd te worden (punt 20).
- 5. VERVOER** | Voor verplaatsingen kan weer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij gebruik van productie-auto's hoeft geen plastic afscheiding meer aangebracht te worden, mits vooraf wordt gereserveerd, een gezondheidscheck wordt gedaan en een mondkapje wordt gedragen (punt 22).
- 6. MEDIUM RISK** | Voor personen die in hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden én geen beschermende kleding kunnen dragen (zonder dat sprake is van intieme scènes), geldt dat zij tijdens de repetitie- en opnameperiode niet meer in thuisisolatie hoeven te blijven. Voorwaarden zijn dat deze personen geen klachten hebben en dat zij werken in een controleerbare groep met herhaalcontacten (punt 46).
- 7. HIGH RISK** | Intieme scènes of scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode wél in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden op COVID-19 (punt 47 en 48). Zie ook de toelichting met betrekking tot preventief testen.

Testen bij (milde) gezondheidsklachten

Voor iedereen die bij een productie betrokken is geldt dat hij/zij thuis moet blijven bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius tot u 24 uur klachtenvrij bent. Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) geldt dit ook voor hun huisgenoten.

In geval van gezondheidsklachten die passen bij COVID-19, wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een besmetting met het coronavirus - bijvoorbeeld via de GGD of huisarts (punt 7 en 8 van het protocol). Voor het maken van een afspraak belt u met het landelijke nummer **0800-1202**. Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen>

Indien onverhoopt binnen cast en crew sprake is van een bevestigde COVID-19-besmetting, dan wordt diegene door de GGD gevraagd zijn/haar contacten (vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen) door te geven. De GGD benadert vervolgens deze personen en legt uit welke maatregelen zij moeten nemen.

Preventief testen (HIGH RISK-situaties)

Het protocol schrijft voor dat personen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen (met intensief fysiek contact) preventief diagnostisch getest dienen te worden (punt 48). Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.

Wat betreft preventief testen gelden de volgende bepalingen:

- Preventief testen op COVID-19 gebeurt uitsluitend door middel van de zogenaamde PCR-test (polymerase chain reaction).
- De analyse van deze test vindt plaats door een laboratorium dat geaccrediteerd is voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek. Een lijst van deze laboratoria vind je hier (par. 6.1 en 6.2): <https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend>
- De uitslag hiervan is doorgaans binnen 48 uur beschikbaar.
- Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en niet toegestaan.

- Geteste personen verbinden zich aan de strikte richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.
- Zodra vastgesteld is dat de geteste personen niet besmet zijn met COVID-19, dienen scènes die in de HIGH RISK-categorie vallen (waarbij sprake is van intensief fysiek contact) zoveel mogelijk op één en dezelfde dag opgenomen te worden.
- Indien sprake is van meerdere opnamedagen voor high risk-scènes, zullen de betreffende personen preventief worden getest in een cyclus die hierop aansluit. Preventief diagnostisch testen wordt zodoende een onderdeel van de dagroutine.
- De werkvloer/ opnamelocatie moet ingedeeld worden in zones. Geteste en niet-geteste mensen moeten te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
- Het aantal personen op de set tijdens intieme scènes dient zo veel mogelijk beperkt te worden.

FAQ

Wie is verantwoordelijk voor de preventieve tests?

Preventief testen is alleen noodzakelijk voor degenen in de HIGH RISK-categorie, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief lichamenlijk contact. Dit gebeurt altijd in de context van een productie. De organisatie én de kosten van het preventief testen komen daarmee voor rekening van de productie. De hiermee gemoeide kosten kunnen opgevoerd worden als COVID-19-gerelateerde meerkosten.

Kan ik gebruik maken van de GGD-teststraten voor preventieve diagnostische tests?

De GGD-teststraten zijn bedoeld voor personen die kampen met (lichte) gezondheidsklachten die passen bij COVID-19. Het is vooralsnog onduidelijk of het toegestaan is deze teststraten te gebruiken voor preventieve tests (die eventueel meermaals uitgevoerd moeten worden). We raden aan om PCR-tests uit te laten voeren door een daartoe geaccrediteerd (onafhankelijk) microbiologisch laboratorium.

Er worden ook (snel)testen aangeboden door commerciële partijen, kan ik hiervan gebruikmaken?

Alleen PCR-tests zijn door het RIVM aangemerkt als betrouwbaar instrument om een COVID-19-besmetting vast te stellen. Andere (zelf)testen zijn vooralsnog niet gevalideerd door het RIVM en voldoen dus niet. Er zijn ook zogenaamde serologische (snel)testen die aantonen of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in je bloed zitten. Ook deze volstaan niet in geval van HIGH RISK-situaties.

Zie ook: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>